

## 日本紅斑熱の発生について

市内において、日本紅斑熱(4類感染症)の発生届がありましたので、北九州市感染症公表要領に基づきお知らせいたします。

1 概要 令和7年9月29日(月)、日本紅斑熱の届出があった。

2 患者情報 遠賀郡在住、80代、男性(虫の刺し口様皮疹あり)

3 経過 9月12日(金) 動作が鈍くなる。  
9月15日(月) 歩きにくくなる。  
9月17日(水) 全身の発疹あり。  
9月18日(木) 手指の関節痛あり。  
9月20日(土) 発熱、足の腫れあり。  
9月22日(月) A医療機関を受診し、B医療機関を紹介受診。入院となる。  
9月23日(火) 皮膚検体採取。  
9月24日(水) 行政検査依頼あり。  
9月26日(金) 検査の結果、日本紅斑熱と判明。  
9月29日(月) 退院。

4 現在の状況 症状無し

5 感染原因 不明

6 行政対応 患者に対する健康調査の実施。

7 日本紅斑熱の北九州市への届出状況(単位:人)

(令和7年9月30日現在)

|                 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年         |
|-----------------|------|------|------|------|------|--------------|
| 発生届出数<br>(単位:人) | 0    | 2    | 0    | 0    | 1    | 3<br>(本件を含む) |

## 8 その他

- 患者及び家族等の個人情報については、プライバシー保護の観点から、提供資料の範囲内にさせていただきます。ご理解の上、特段のご配慮をお願いいたします。
- 本市においては、別添「《日本紅斑熱について》の予防のポイント」について市民の皆様と呼びかけています。  
報道各位におかれても、別添「《日本紅斑熱について》の予防のポイント」の内容の周知にご協力いただきますようお願いいたします。

9 日本紅斑熱について 別添参照

## 《日本紅斑熱について》

### ➤ 日本紅斑熱とは

日本紅斑熱は、日本紅斑熱リケッチアを保有するマダニ(キチマダニ、フタトゲチマダニなど)に咬まれることで感染します。日本では、1984年に初めて患者が報告されました。発生時期は、マダニが活動する春～秋ですが、気候などで地域差が見られます。

### ➤ 症状

マダニに咬まれてから2～8日頃から頭痛、全身倦怠感、高熱などを伴って発症します。発熱、発疹(米粒大から小豆大の紅い斑点)、および刺し口(マダニ類に刺された部分が直径5～10mm程度に赤く腫れ、中心部に黒いカサブタや潰瘍のようになったもの)が主要三徴候です。重症化して死亡することもあります。

### ➤ 感染経路

野山などで、紅斑熱群リケッチアの一種 *Rickettsia japonica* を保有するマダニに咬まれることによって、感染します。

### ➤ 予防のポイント

- ・山林、草地、川原などに入る場合には、長袖、長ズボン、足を完全に覆う靴を着用して肌の露出を少なくしましょう。
- ・屋外活動後は、マダニが衣類や身体についているかもしれないため、速やかに入浴し、念入りに身体を洗い流しましょう。

### 【市民の皆さまへ】

- ・山林、畑や河川敷に行った後に、頭痛やだるさが強く、高熱が続いたり、発疹が出たりした場合には、早めに医療機関を受診してください。
- ・マダニ咬まれたときは、無理に引き抜こうとせず、医療機関(皮膚科)で処置(マダニの除去、洗浄など)をしてもらってください。
- ・また、マダニに咬まれた後、数週間程度は体調の変化に注意し、発熱等の症状が認められた場合は医療機関で診察を受けて下さい。