

新型コロナウイルスワクチン一覧表(定期接種用)

北九州市健康危機管理課
令和6年10月3日

販売名		コミナティ筋注シリンジ 12歳以上用	スパイクバックス筋注	ダイチロナ筋注	コスタイベ筋注用	ヌバキソビッド筋注1ml
販売会社		ファイザー社	モデルナ社	第一三共社	MeijiSeikaファルマ社	武田薬品工業社
用法・用量	定期接種対象者の1回接種量	0.3ml	0.5ml	0.6ml	0.5ml	0.5ml
	接種方法	筋肉内に接種				
	同時接種	医師が必要と認めた場合には、他のワクチンと同時に接種することが可能				
副反応	50%以上	痛み※1、疲労、頭痛	痛み※1、疲労、頭痛	痛み※1、倦怠感	痛み※1	痛み※1、疲労、筋肉痛、頭痛
	10～50%	筋肉痛、悪寒、関節痛、発熱、下痢、腫れ※1	筋肉痛、悪寒、関節痛、吐き気・嘔吐、リンパ節の腫れや痛み、発熱、腫れ※1、しこり※1、赤み※1	熱感※1、腫れ※1、赤み※1、かゆみ※1、しこり※1、頭痛、発熱、筋肉痛	倦怠感、頭痛、悪寒、筋肉痛、関節痛、発熱、めまい、腫れ※1、しこり※1、赤み※1	倦怠感、関節痛、吐き気・嘔吐
	1～10%	赤み※1、リンパ節の腫れや痛み、嘔吐、疼痛	痛み※2、腫れ※2、赤み等※2	赤み※2、腫れ※2、かゆみ※2、熱感※2、しこり※2、痛み※2、リンパ節の腫れや痛み、発疹、腋の痛み	かゆみ※1、下痢、吐き気、嘔吐	腫れ※1、しこり※1、赤み※1、発熱、四肢痛
調製方法		—	—	—	日局生理食塩液10mlにて溶解 日局生理食塩液10mlを複数回(少なくとも3回)に分けて注入	—
貯法等の概要	貯法	2～8℃	-20±5℃	2～8℃	-20±5℃	凍結を避け2～8℃
	有効期間	8か月	12か月	7か月	18か月	9か月
	使用前の準備	室温に戻す	遮光して冷蔵庫(2～8℃)又は常温(15～25℃)で解凍、常温に戻す	常温に戻す	溶解前に常温に戻す	常温に戻す
	準備後の保存	[使用前] 8～30℃で12時間まで保存可能 [先端キャップを外した後] 2～30℃で保存し、4時間以内に使用	[解凍後保存] 遮光して2～8℃で最長30日間 8～25℃で最長24時間	冷蔵庫から取り出して12時間以内に使用。 1回に限り再度冷蔵庫に戻し、最大で24時間保存可能	[室温に戻す前(溶解前)の保存] 冷蔵庫(2～8℃)で1か月間保存可能	速やかに使用
	一度針を刺したバイアルの保存	—	遮光して2～25℃で保存 12時間以上経過したものは廃棄	2～8℃で保存 24時間以内に使用	溶解後2～25℃で保存 6時間以内に使用	遮光して2～8℃で保存 24時間以上経過したものは廃棄
	1シリンジ/バイアルあたりの容量	0.3ml(1回分)	2.5ml(0.5ml/回で5回分)	1.5ml(2回分)	16回分	1ml(2回分)

※1 ワクチンを接種した部位の症状 ※2 接種後7日以降に現れる、ワクチンを接種した部位の症状

※詳細は各メーカーの添付文書等をご参照ください。